

製品説明書

【お薬の内容】



<Kyowa-Gifu-Japan>

ご使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。また必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品 **アレルギー専用鼻炎薬** (錠剤)

日本薬局方フェキソフェナジン塩酸塩錠

ノスポール鼻炎錠FX

くしゃみ、鼻水、鼻つまりなどは、鼻炎や副鼻腔炎によってあらわれ、気分がすぐれないばかりか、睡眠不足や過労、集中力の低下など、日常生活も不快にします。

ノスポール鼻炎錠FXは、1回1錠、1日2回服用でフェキソフェナジン塩酸塩が花粉やハウスダストなどによるアレルギー症状を緩和します。また、口の中が渇きにくく、眠くなりにくいアレルギー専用鼻炎薬です。

有効成分 (2錠中/一日量)

フェキソフェナジン塩酸塩 120mg

使用目的

抗ヒスタミン薬

有用性

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻水、鼻つまり。

警告

15歳未満の小児には使用しないこと。

[使用を避けること]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 15歳未満の小児。

2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、制酸剤(水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤)、エリスロマイシン。

- 3 この薬を服用する前後にアルコールを飲まないでください。
- 4 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

[相談すること]

- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) アレルギー性鼻炎または風邪のような他の原因があるかどうか知らない人。
 - (3) 気管支喘息、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。
 - (4) 鼻つまりの症状が強い人。
 - (5) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	のど・まぶた・口唇などのはれ、発疹、かゆみ、じんましん、皮膚が赤くなる。
消化器	吐き気、嘔吐、腹痛、消化不良。
精神神経系	しびれ感、頭痛、疲労、倦怠感、めまい、不眠、神経過敏、悪夢、睡眠障害。
泌尿器系	頻尿、排尿困難。
その他	動悸、味覚異常、浮腫、胸痛、呼吸困難、血圧上昇、月経異常。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。
無顆粒球症、白血球減少、好中球減少	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

- 3 服用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状が持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

口に渴き、便秘、下痢、眠気。

用法・用量

次の量を朝夕に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	1回
15歳未満	服用しないでください	

[用法・用量に関する注意]

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早目の時期からの服用が効果的です。
- (3) 継続して服用することで効果が得られます。
- (4) 1週間服用しても症状の改善が見られない場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。また、症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
- (5) 錠剤の取り出し方。

下図のように、錠剤が入っているPTPシートの突起を指先で強く押し、裏面のアルミシートを破って取り出して服用してください。
(誤ってPTPシートを飲み込むと、食道粘膜に刺さるなどの思わぬ事故につながります。)



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

添加物:

部分アルファ化澱粉、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ピプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、酸化鉄、黄色酸化鉄、カルナバワックス。

質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (週末、祝日を除く)

[限定対応のお願い]

<Kyowa-Gifu-Japan>

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト (www.kyowa-ci.co.jp) に掲載されています。

免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。

- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は最新改訂年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。