

# 製品説明書

## 【お薬の内容】



<Kyowa-Gifu-Japan>

ご使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。また必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

鼻炎用薬

(錠剤)

## ノスポール鼻炎チュアブル錠II

「ノスポール鼻炎チュアブル錠II」はくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどを効果的に改善する4つの有効成分のバランスのとれた成分の組み合わせです。また、水なしで服用できるチュアブルタイプなので、どこでも簡単に服用できます。

### 有効成分 ( 6錠中/一日量 )

フェニレフリン塩酸塩 30mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg

ベラドンナ総アルカロイド 0.45mg

グリチルリチン酸 30mg

無水カフェイン 60mg

### 使用目的

鼻づまり治療

抗ヒスタミン薬

鼻粘液分泌調整

のどの痛みと咳を鎮める

眠気予防

### 有用性

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による以下の症状の緩和:くしゃみ、鼻水(鼻汁が多い)、鼻づまり、目の痛み、のどの痛み、頭痛(重い頭)

### 警告

7歳未満の子供には使用しないこと。

### 【使用を避けること】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

鼻炎または抗ヒスタミン薬を含むその他の内服薬(かぜ薬、鎮咳薬、乗り物酔い薬、アレルギー薬など)、消化管鎮痛痙攣。

2. この薬を服用した後に車を運転したり機械を操作したりしないでください。(眠気、かすみ目、目のまぶしさなどの症状が発生することがあります。)
3. 長期連続使用しないでください。

## [相談すること]

1. 次の人は、この薬を使用する前に医師、薬剤師、または登録販売者に相談する必要があります。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊娠中の女性または妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人  
高熱、排尿障害
  - (6) 次のように診断された人。  
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、消化不良
精神神経系	頭痛
泌尿器系	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯肉の出血、発熱、皮膚や粘膜の色が悪い、疲労、動悸、息切れ、気分の悪化、血尿など
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状が持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

のどの渇き、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5～6回服用しても症状がよくない場合は、薬の服用を中止して、この添付文書を使用して医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

## 用法・用量

次の量をかむか、口の中で溶かしてください。しかし、投与の間に少なくとも4時間かかるようにしてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満の子供	服用しないこと	

### 【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方

下図のように、錠剤が入っているPTPシートの突起を指先で強く押し、裏面のアルミシートを破って取り出して服用してください。

(誤ってPTPシートを飲み込むと、食道粘膜に刺さるなどの思わぬ事故につながります)



- (4) PTPシートから取り出すときは、錠剤を破損しないように注意してください。
- (5) 濡れた手で錠剤を扱わないでください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

## 添加物:

乳糖、スクラロース、ポリビニルアルコール、アクリル酸、メタクリル酸メチル共重合体、キシリトール、クロスポピドン、ケイ酸アルミニウム、セルロース、二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、タウマチン、D-マンニトール、リン酸水素カルシウム、ヒドロキシプロピル澱粉、ペパーミント油およびクロス-CMC- ナトリウム

## 質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (週末、祝日を除く)

### [限定対応のお願い]

### <Kyowa-Gifu-Japan>

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト ([www.kyowa-ci.co.jp](http://www.kyowa-ci.co.jp)) に掲載されています。

## 免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は最新改訂年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。