

第②類医薬品

**コンフラージュEX PREMIUM**

頭皮治療薬の液体治療薬

---

鎮痒消炎薬 第②類医薬品

**コンフラージュEX PREMIUM**

【特徴】

- 8つの有効成分が、つらい頭皮のかゆみ、湿疹に効きます
- プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(アンテドラッグステロイド)配合
- l-メントール配合でスツツと爽やかな使い心地です
- 患部に直接塗布しやすいピンポイント容器です

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：  
協和薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎058-246-8771  
受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

**目には入れないこと**

火気厳禁  
第二石油類、危険等級Ⅲ  
(エタノール)

製造 協和薬品工業株式会社  
販売元 岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

4 962307 092156

セルフケアアクション  
税 控 除 対 象

かゆくて辛い方に


# 頭皮トラブルの

液体治療薬

炎症を鎮める

アンテドラッグ型抗炎症成分

## PVA配合



かゆくて辛い方に  
頭皮を湿疹  
湿疹  
かぶれ  
かゆみ

**目には入れないこと**

コンフラージュEX PREMIUM  
30mL

第②類医薬品

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名:コンフラージュEX PREMIUM  
【効能・効果】 かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ  
【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布してください。  
【用法・用量に関連する注意】 (1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)本剤は外用にのみ使用し内服しないでください。(5)患部が傷になってしまっている場合は、塗布したときにしみる場合があります。  
【容器の使用法】 (1)使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2~3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)(2)使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます。)  
【成分・分量】 (100mL中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(アンテドラッグステロイド剤 PVA) 0.15g、ジフェニヒドラミン塩酸塩 2.0g、クロタミトン 3.0g、グリチルリチン酸二カリウム 0.2g、l-メントール 3.5g、リドカイン 1.0g、イブプロビルメチルフェニール 0.1g、アラントイン 0.2g / 添加物として、1,3-ブチレンジオール、ジブチルセドロキシルエン、エタノール、pH調整剤、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有します。  
【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(5)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、プラスチック類、繊維の衣類、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。(6)染めた髪につくと色落ちすることがあります。(7)使用後はキャップをしっかりと締めてください。(8)使用期限(箱底面に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

☒ **してはいけないこと**  
守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります  
1. 次の部位には使用しないでください  
(1)水疱(水ぼうそう)、みずむし(たむし)等又は化膿している患部。(2)創傷面、目の周囲、粘膜炎等。  
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください  
3. 長期連用しないでください

☒ **相談すること**  
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かぶれ等)を起こしたことがある人。  
(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。  
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

8つの成分が  
**すばやく治す**



**頭皮などの  
湿疹 かゆみ  
かぶれ**

コンフラージュEX  
PREMIUM  
30mL

第②類医薬品

台豊薬機  
函館出羽

D2305