

製品説明書**【お薬の内容】**

〈Kyowa-Gifu-Japan〉

ご使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。また必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第②類医薬品

持続性鼻炎用内服薬**(カプセル剤)****新ノスポール鼻炎カプセル**

「新ノスポール鼻炎カプセル」は、溶解してすぐに効果を発揮する粒子と一定時間後に効果を示す粒子を組み合わせているため、作用が持続します。そのため、一日に朝・夕2回の服用で症状の改善をはかることができます。

有効成分 (2カプセル中/一日量)**使用目的**

塩酸プソイドエフェドリン 70mg

鼻つまり治療

クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg

抗ヒスタミン薬

ベラドンナ総アルカロイド 0.4mg

鼻粘液分泌調整

無水カフェイン 100mg

眠気予防

有用性

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による以下の症状の緩和：くしゃみ、鼻水（鼻汁が多すぎる）、鼻つまり、目の痛み、のどの痛み、頭痛（重い頭）

警告

15歳未満の小児には使用しないこと。

[使用を避けること]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1 次の人は服用しないでください

(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 次の症状のある人

前立腺肥大による排尿障害

(3) 次のように診断された人。

高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

抗ヒスタミン薬を含む鼻炎のための他の内服薬。(風邪薬、鎮咳去痰薬、乗り物酔い薬、アレルギー治療薬など)、胃腸鎮痛薬、痙攣

3 この薬を服用した後に車を運転したり機械を操作したりしないでください。(眠気、かすみ目、異常なまぶしさなどの症状が発生することがあります。)

4 長期連続使用しないでください。

[相談すること]

1 次の人は、この薬を使用する前に医師、薬剤師、または登録販売者に相談する必要があります。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊娠中の女性または妊娠している疑いのある女性

(3) 授乳中の人。

(4) 高齢者。

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 不眠、めまい、脱力感、かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎内用薬などによる動悸を起こしたことがある人。

(7) 次の症状のある人

高熱、排尿障害

(8) 次のように診断された人。

緑内障、腎臓病

(9) モノアミンオキシダーゼ阻害剤(塩酸セレギリンなど)による治療を受けている人。

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠症、過敏性、頭痛、けいれん
泌尿器系	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス-ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症、急性全身性発疹膿疱症。	高熱、目の充血、発疹、唇のただれ、のどの痛み、広範囲の発疹/発赤、発赤した皮膚の小さな隆起(小水疱)。全身のだるさ、食欲がないなどが持続するか、突然悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯茎の出血、発熱、皮膚や粘膜の色が悪い、疲労、動悸、息切れ、気分の悪化、血尿など
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

- 3 服用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状が持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

のどの渇き、眠気、便秘、目のかすみ

- 4 5~6回服用しても症状がよくない場合は、薬の服用を中止して、この添付文書を使用して医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

用法・用量

次の量を朝夕に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回
15歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法及び用量を厳守してください。

(2) カプセル剤の取り出し方

下図のように、カプセルが入っているPTPシートの突起を指先で強く押し、裏面のアルミシートを破って取り出して服用してください。

(誤ってPTPシートを飲み込むと、食道粘膜に刺さるなどの思わぬ事故につながります)



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

添加物:

コーンスターチ、ラクトース、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、カプセル本体中のゼラチン、及びラウリル硫酸ナトリウム。

質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (週末、祝日を除く)

[限定対応のお願い]

<Kyowa-Gifu-Japan>

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト (www.kyowa-ci.co.jp) に掲載されています。

免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は最新改訂年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。