

20mL×2本入

20_{ml}×2本入

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

合名会社 東宝映画
岐阜県岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地

癸元

協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号
問い合わせ先 ☎0120-468-771

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2. 小児の手の届かない所に保管してください。3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

4. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

成分・分量】旧量(2本・40ml)中
 α-ホウリン酸化水素酸塩水和物……………0.48mg
 α-カルシウムミツラン酸塩……………8mg
 黒カフイン……………100mg
 添加物として白糖、クエン酸水和物、安芸青酸ナトリウム、香料を含有します。

香料を含有します。

△使用上の注意

❌してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人：排尿困難(6) 次の診断を受けた人：緑内障、心臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
☐ のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

大事な出張・楽しい旅行に

乗物酔い による めまい・はきけに

AIRPLANE

**BUS**

SHIP



乗る前に
1本

【内服液タイプ】

20mL×2本入

第2類
医薬品

**乗る前に
1本**

乗物酔いによる
めまい・はぎけに
新アーク-内服液

第2類医薬品

20mL×2本入

【効能・効果】
乗物酔いによるめ
及び緩和

【用法・用量】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防
及び緩和

【用法・用量】

成人（15歳以上）1回1本（20mL）を服用してくだ
さい。乗物酔いの予防には乗車前30分前に
1回1本を服用します。なお、必要に応じて追加
服用する場合には、1回1本を4時間以上の間
隔をおき服用してください。1日の服用回数は2
回を限度とします。

●用法・用量を厳守してください。
●小児には服用させないでください。