

製品説明書

【お薬の内容】



〈Kyowa-Gifu-Japan〉

ご使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。また必要な時に、読めるように大切に保管してください。

感冒薬 (シロップ剤)

ノスポールこどもかぜシロップS

ノスポールこどもかぜシロップSは、生薬成分に甘草エキスとキキョウ流エキスを加え、アセトアミノフェン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物などの5種類の有効成分を含む小児用風邪薬です。

有効成分の働きにより、風邪みより体力が消耗されやすい小児の発熱、のどの痛み、咳、痰、鼻水、鼻づまりなどの症状を和らげます。

有効成分 (60 mL中 / 最大1日用量)	使用目的
アセトアミノフェン 300mg	解熱鎮痛薬
マレイン酸クロルフェニラミン 2.4mg	くしゃみ、鼻水、鼻詰まりを抑える
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg	咳を減らす
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 16mg	気管支拡張薬
無水カフェイン 32mg	頭痛を軽減
甘草エキス 50mg	のどの痛みと咳を鎮める
桔梗流エキス 0.24mg	痰を出しやすくする

有用性

風邪のさまざまな症状の緩和(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、咳、痰、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)。

警告

*子供向けの薬にもかかわらず、風邪薬として指定されている一般的な予防措置について説明しています。

〔使用を避けること〕

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) この薬または他の風邪薬、解熱鎮痛薬を服用した後に喘息にかかったことがある人。

2. この薬を服用している間は、次のいずれの薬も使用しないでください。

風邪薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン薬などを含む内服薬（鼻炎、乗り物酔い薬、アレルギー薬などの内服薬）

3. この薬を服用した後に車を運転したり機械を操作したりしないでください。（眠気などの症状が発生することがあります）
4. この薬を飲む前後にアルコールを飲まないでください。
5. 長期連用をしないでください。

[相談すること]

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師または歯科医の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状がある人。

高熱・排尿障害。

(6) 次のように診断された人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

呼吸器系	息切れ、息苦しさ
泌尿器系	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服薬後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性膿疱症	高熱、目の充血、発疹、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範な発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚の黄変および白目)、褐色尿、全身がだるい、食欲不振などが現れます。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢などが現れる。
間質性肺炎	階段を上る、または少し無理をすると、息切れします・息苦しい、空せき、発熱などがみられ、これらは突然現れたり持続したりする。
ぜんそく	呼吸すると、ゼーゼー、ヒューヒューと鳴る。息苦しい等が現れる。
再生不良性貧血	青いあざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚および粘膜が青白く見え、疲労、動悸、息切れ、気分が悪化しくらっとする、血尿などが現れます。
無顆粒球症	突然の高熱、悪寒、のどの痛みなどが現れます。

3. 服用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状が持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

口に渴き、眠気。

4. 5～6回服用しても症状がよくない場合は、薬の服用を持って、この添付文書を使用して医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

用法・用量

食事後、必要に応じて就寝前に、付属の計量カップを使用して、1日3回服用してください。場合によっては、約4時間間隔で1日6回まで服用できます。

年齢	1回量	1日服用回数
3歳以上7歳未満	10mL	3～6回
1歳以上3歳未満	7mL	
6カ月以上1歳未満	6mL	
3カ月以上6カ月未満	5mL	
3カ月未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関する注意〕

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 2歳未満の乳幼児に使用するには、医師の診断を受けさせることを優先してください。止むを得ない場合にのみ服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓をして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4) この薬を服用後、ボトルの口を拭き、蓋を締めてください。閉まりが悪いと、内部の液体が流出したり汚染する可能性があります。
- (5) 服用後は計量カップをよく洗って、清潔に保管してください。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点からできるだけ早く使い切ってください。
- (7) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

[保管に関するお願い]

キャップがかたいときはビンの中にお湯が入らないように注意しながら、キャップをお湯(50～60℃)で温めてください。その際、お湯の温度が高すぎるとやけどをしあたり、瓶が割れてけがをすることがありますので、十分ご注意ください。

添加物:

白糖、D-ソルビトール、安息香酸ナトリウム、パラベン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、キャラメル、香水、グリセリン、バニリン、プロピレングリコール

質問やコメント?

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00 (週末、祝日を除く)

[限定対応のお願い]

〈Kyowa-Gifu-Japan〉

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト (www.kyowa-ci.co.jp) に掲載されています。

免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬事法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。