

# 製品説明書

## 【お薬の内容】



<Kyowa-Gifu-Japan>

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。(2022年7月改 記載要領変更に伴う改訂)

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

(カプセル剤)

## ノスポール鎮咳カプセル

ノスポール鎮咳カプセルは、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ノスカピン、グアイフェネシンの鎮咳去痰成分を配合したカプセル剤です。つらいせき・たんの症状を改善いたします。

### 成分・分量 本品1日量(6カプセル)中

成分	分量	働き
ジヒドロコデインリン酸塩	18.0mg	鎮咳薬
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40.0mg	気管支拡張薬
ノスカピン	60.0mg	鎮咳薬
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	抗ヒスタミン薬
グアイフェネシン	300.0mg	去痰薬
無水カフェイン	150.0mg	頭痛薬

### 添加物

バレイショデンプン、乳糖、セルロース、カルメロースCa、ヒプロメロース、赤色2号、赤色102号、カプセル本体にゼラチン、青色1号、赤色102号、ラウリル硫酸Na、亜硫酸水素Naを含有します。

### 効能・効果

せき、たん



### 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

**1 次の人は服用しないでください**

12歳未満の小児。

**2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

**3 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**

（眠気等があらわれることがあります。）

**4 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**

**5 過量服用・長期連用しないでください**

**相談すること**



**1 次の人は、この薬を使用する前に医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください**

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症。

**2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻出血、歯茎の出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさなどがあらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この添付文書を使用して医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

## 用法・用量

カプセルは、そのまま水または温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
12歳以上15歳未満	1カプセル	
12歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意事項>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセル剤の取り出し方。

右図のように、カプセル剤が入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

(誤ってPTPシートをそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

〈カプセルの取り出し図〉



## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

## 質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771



受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00 (週末、祝日を除く)

[限定対応のお願い]

〈Kyowa-Gifu-Japan〉

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト ([www.kyowa-ci.co.jp](http://www.kyowa-ci.co.jp)) に掲載されています。

## 免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は最新改訂年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。