

# 製品説明書

## 【お薬の内容】



<Kyowa-Gifu-Japan>

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

口腔・咽喉用薬

(錠剤)

## パルウィンTX錠

抗炎症成分のトラネキサム酸を配合。炎症のもとに作用して、のどの痛みやはれを鎮め、つらい口内炎も抑える治療薬です。  
皮膚や粘膜の機能を正常に働かせるビタミンB<sub>2</sub>・ビタミンB<sub>6</sub>とビタミンCも配合しています。

### 【成分・分量 (6錠中/成人一日服用量)】

### 使用目的

トラネキサム酸 750mg	.....	抗プラスミン成分	
カンゾウ乾燥エキス 198mg	.....	のどの痛みを抑える	
(原生薬として990mgに相当)			
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	50mg	.....	ビタミン B <sub>6</sub> の補給
リボフラビン (ビタミンB <sub>2</sub> )	12mg	.....	ビタミン B <sub>2</sub> の補給
L-アスコルビン酸ナトリウム(ビタミンCナトリウム)	500mg	.....	ビタミン Cの補給

### <成分に関する注意事項>

- 本剤に含まれているリボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)により、尿が黄色くなることがあります。
- 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合には、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

【効能・効果】 口内炎、咽頭炎、扁桃炎(のどのはれ、のどの痛み)



### 【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**1. 次の人は服用しないでください**

透析療法を受けている人。(けいれんがあらわれることがあります。)

**2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。**

- (1) 甘草(カンゾウ)又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬等。(むくみ、血圧上昇及び筋疾患(ミオパチー)等が起こることがあります。)
- (2) トラネキサム酸を含有する内服薬。(鼻炎用薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等)

**3. 長期連用しないでください。**



**相談すること**

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1) 医師又は歯科医の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

(6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等)、血栓症を起こす恐れのある人。

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感

精神神経系	めまい
その他	頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 5～6日服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【用法・用量】

下記一回量を一日3回、朝昼晩に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
7歳から15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

### <用法・用量に関する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 食前・食後のいずれの服用でもかまいません。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 錠剤の取り出し方。

右図のように、錠剤が入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。



(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。)

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤をぬれた手で取り扱わないでください。(水分が錠剤に付くと、表面が一部溶けて変色又は色むらを生じることがあります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 一度内袋(アルミ袋)を開封した後は、品質保持の点から開封後6ヵ月以内に服用してください。

## 【添加物】

セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、シヨ糖脂肪酸エステル、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、三二酸化鉄を含有します。

## 質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎ 058-246-8771



受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (週末、祝日を除く)

[限定対応のお願い]

<Kyowa-Gifu-Japan>

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。

- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト ([www.kyowa-ci.co.jp](http://www.kyowa-ci.co.jp)) に掲載されています。

## **免責事項**

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は日本語添付文書に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性もあります。