**ご使用に際して、このケースを必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。**

外用殺菌消毒薬 **パトマロンK軟膏** 第2類医薬品

⚠使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
   （1）医師の治療を受けている人。（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。（3）患部が広範囲の人。（4）深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量　1日数回適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉（1）用法・用量を厳守してください。（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。（3）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。（4）本剤は外用にのみ使用してください。（5）患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

OPEN➡

効能・効果　切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

成分・分量（100g中）

成分名	分量	働き
濃ベンザルコニウム塩化物液50	0.6g	殺菌・消毒の作用があります。
グリチルレチン酸	0.3g	炎症を抑える作用があります。
ジブカイン塩酸塩	0.1g	痛みを抑えます。

添加物として、セタノール、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）（4）使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 058-246-8771
受付時間　9:00～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

切　傷　すり傷　靴ずれ

殺菌消毒薬

パトマロンK軟膏

第2類医薬品

15g

切傷・すり傷・靴ずれに

殺菌消毒薬

パトマロンK軟膏

濃ベンザルコニウム塩化物液50配合

PatmaronK　15g

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

第2類医薬品

切傷・すり傷・靴ずれに

殺菌消毒薬

濃ベンザルコニウム塩化物液50
グリチルレチン酸
ジブカイン塩酸塩配合

PatmaronK
15g

発売元
協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元
日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-2

4 962307 093023

紙:箱　プラ:キャップ　金 属:チューブ

製造番号

使用期限

第2類医薬品
パトマロンK
軟膏

第2類医薬品
パトマロンK
軟膏