

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミン含有保健薬 第3類医薬品

新ビタアルトQX

新ビタアルトQXは、臭いを抑えたニンニク製剤のオキソアミチン末、疲れに効くL-アルギニン塩酸塩とガンマ-オリザノール、体に元気をつけるロクジョウ末及び各種のビタミンを配合いたしました。なかなか疲れが抜けない人や食欲がない人、授乳中の人などの栄養補給はもちろん、体が弱い人や「今日もがんばるぞ」という人にぴったりなお薬です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

次の量を服用して下さい。1日2回服用する場合は朝夕服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	1~2回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉
用法・用量を厳守して下さい。

成分・分量

1日量(2錠)中に、次の成分を含有します。

成分	分量
オキソアミチン末	50mg
L-アルギニン塩酸塩	50mg
ロクジョウ末	10mg
チアミン硝化物	10mg
リボフラビン	4mg
ピリドキシン塩酸塩	10mg
ニコチン酸アミド	25mg
無水カフェイン	50mg
L-アスコルビン酸ナトリウム	112.6mg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム	20.7mg
ガンマ-オリザノール	10mg

添加物として、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、炭酸Ca、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、酸化チタン、三二酸化鉄、黄色5号、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビンによるもので心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、ぬれた手で触れないで下さい。
- (5) びんの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いて下さい。
- (6) びんの中の「紙包み」は乾燥剤です。取り出したり、開けたり、食べたりしないで下さい。
- (7) 箱の内蓋の「開封年月日」欄に、開封日を記入して下さい。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持のため、6ヵ月以内に服用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-468-771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **協和薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元 **渡辺薬品工業株式会社**
富山県富山市水橋北馬場1番7*