

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 鼻炎用内服薬(チュアブルタイプ) 第2類医薬品

# スルーロン鼻炎チュアブル

スルーロン鼻炎チュアブルは、バランスよく配合された4種類の有効成分のはたらきで、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどを効果的に改善します。また、水なしで服用できるチュアブルタイプなので、どこでも簡単に服用できます。

### 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

##### 1. 次の人は服用しないで下さい

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

##### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

##### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

##### 4. 長期連用しないで下さい

#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。  
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧

##### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

##### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

##### 4. 5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

## 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

## 用法・用量

次の量をかむか、口中で溶かして服用して下さい。ただし、服用間隔は4時間以上おいて下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシート  
の凸部を指先で強く押して、裏  
面のアルミ箔を破り、取り出して服用  
して下さい。（誤ってそのまま飲み込  
んだりすると食道粘膜に突き刺さる  
等思わぬ事故につながります。）

〈錠剤の取り出し図〉



## 成分・分量

1日量（3錠）中、次の成分を含有します。

成分	分量
フェニレフリン塩酸塩	15.0mg
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6.0mg
ベラドンナ総アルカロイド	0.6mg
無水カフェイン	60.0mg

添加物として、還元麦芽糖水アメ、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、グリシン、カルメロース、クズデンプン、シヨ糖脂肪酸エステル、*l*-メントール、香料を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

**☎ 0120-468-771**

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 **協和薬品工業株式会社**  
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元 **渡辺薬品工業株式会社**  
富山県富山市水橋北馬場1番7\*