

A3108



第2類医薬品 15g

TESITON VS CREAM

花粉や乾燥などによる かゆみ 化粧かぶれに

お肌にやさしい皮ふ治療薬

非ステロイド系抗炎症剤



上段は使用期限
下段は製造番号です。

顔などの湿疹、かぶれに
テシトンVSクリーム
第2類医薬品



赤み

化粧かぶれ

乾燥によるかゆみ

花粉によるかゆみ



顔などの
湿疹、かぶれに

目もとのかゆみにも使える

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 テシトンVSクリーム 第2類医薬品

〈皮膚炎・湿疹用薬〉

非ステロイド系抗炎症剤ウフェナートを主成分に、かゆみや炎症を抑えるジフェンヒドラミン、グリチルレチン酸と殺菌消毒作用のあるペンゼトニウム塩化物を配合した外用剤です。乳幼児から大人まで、顔・腕・からだにお使い頂けます。肌にやさしくなびむ、さっぱりとした使い心地のクリームです。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症状 |
|------|--------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感 |
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造販売元 協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

効能・効果

皮膚炎、湿疹、おむつかぶれ、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ



用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)外用のみ使用してください。(4)患部を清潔にした後、塗布してください。

成分・分量

(100g中)ウフェナート 5.0g、ジフェンヒドラミン 1.0g、グリチルレチン酸 0.3g、トコフェロール酢酸エステル 0.5g、ペンゼトニウム塩化物 0.1g、添加物として、ワセリン、ステアリアルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、ペヘニルアルコール、セトマコゴール1000、ジメチルポリシロキサン、パラベン、ジブチルヒドロキシトレン(BHT)を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

本剤について、何かお質問の点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
消費者相談窓口:協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎058-246-8771
受付時間9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)