

製品説明書

【お薬の内容】



〈Kyowa-Gifu-Japan〉

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

外用痔疾用薬

(軟膏)

オシリン



成分・分量

(100g中の量)

はたらき

ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0. 5g・・・	炎症やかゆみ、腫れなどの症状を和らげる
リドカイン	3. 0g・・・	痛みやかゆみを和らげる
酸化亜鉛	4. 0g・・・	火傷、湿疹、陰部のかゆみなどを和らげる
イソプロピルメチルフェノール	0. 1g・・・	殺菌成分
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0. 2g・・・	かゆみを抑える
アラントイン	1. 0g・・・	肌の治療
グリチルレチン酸	0. 3g・・・	抗炎症成分
トコフェロール酢酸エステル	3. 0g・・・	肌荒れやかゆみの防止

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

患部が化膿している人。

2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日1～3回、適量を肛門部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓をして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）

添加物: マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://WWW.pmda.go.jp/kenkouhigai_cmp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

質問やコメント?

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771



受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (週末、祝日を除く)

[限定対応のお願い]

<Kyowa-Gifu-Japan>

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト (www.kyowa-ci.co.jp) に掲載されています。

免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。

(5) この英訳は日本語添付文書に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。