



オシリン軟膏

第②類医薬品

副作用被毒救済制度 ☎120-149-931
 本剤について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
 消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室
 ☎058-246-8771
 受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、祝日を除く)
 製造販売元 協和薬品工業株式会社
 岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

【してはいけないこと】
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 1. 次の人は使用しないでください
 1. 患部が腫れている人
 2. 長期連用しないこと
 3. 相違すること
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1) 医師の治療を受けている人
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 2. 使用中、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この一ページを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この一ページを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

腫状	発疹・発赤・かゆみ・はれ
皮膚	
その他	刺激感、化膿



使用上の注意
 △
 ご使用に際してこのページの記載内容を読み取ってください。また、必要な時を必ず読んでください。

【保及び取扱上の注意】
 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 (3) 他の容器に入れ替えないでください。
 (試用の原因になったり品質が変わります。)

【成分・分量(100g中)】
 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g
 リドカイン 3.0g
 酸化亜鉛 4.0g
 イソプロピルメチルフェニル 0.1g
 クロルニドミソキサリド 0.2g
 フラトリン 1.0g
 トコフェール酢酸エステル 3.0g
 モノステアリン酸トリセチルセスキオレイルエーテル 0.3g
 添加物として、マコロール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、エタノール、セリルセリンを含有します。

【用法・用量】
 1日1~3回、適量を肛門部に塗布してください。
【用法・用量に関する注意】
 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (2) 肛門部におみ使用してください。
【効能・効果】
 きれ痔(さげ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

がまんできない

肛門のかゆみ痛みに



皮膚患部でよく効き 体内では低活性

さらっと塗れてべたつかない軟膏タイプ

オシリン軟膏

第②類医薬品 15g

消炎作用 かゆみ止め作用 殺菌作用

3つの作用で がまんできない症状を抑えます。



さらっと塗れてべたつかない軟膏タイプ

オシリン軟膏

8つの有効成分配合

きれ痔などによる かゆみ・痛み・はれ・出血に

15g



使用期限
製造番号



4 962307 100332