

かゆみ止め治療薬
ラカナウSクリーム
第2類医薬品

かゆみ止め治療薬
ラカナウSクリーム
第2類医薬品

用法・用量
1日数回、患部に適量を塗布してください。

用法・用量に関する注意
(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導のもとに使用させてください。
(3)目に入らぬよう十分に注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

保存及び取り扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かないところに保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(開用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

注意
本治療薬は、トコモノアゼンなどの原因によるかゆみは、医師による指
本治療薬は、トコモノアゼンなどの原因によるかゆみは、医師による指
本治療薬は、トコモノアゼンなどの原因によるかゆみは、医師による指

効能・効果
かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、たぶれ、しもやけ

成分・分量(100g中)

トコモノアゼン	2.08
トコモノアゼン酢酸エステル	0.38
ジフェニルピロリジン塩酸塩	2.08
メチルパラメタクリレート	0.18

逆もどりにくいアルミチューブ
20g

開封口

使用して、このケースの記載内容を必ず読んでください。
また、必ずお読みください。

第2類医薬品
(かゆみ止め治療薬)
販売名 ラカナウS

△使用上の注意
逆もどりにくいこと(すなわち現在の症状が悪化した時、副作用が起りやすくなる)と、トコモノアゼン等の成分が原因で、
1.次の人(1)皮膚の病状を悪化させる可能性がある人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)薬などによりアレルギー反応を起こしたことがある人(4)薬やたばこのひびきなどがある人(5)乳幼児
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

禁忌
次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)皮膚の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)薬などによりアレルギー反応を起こしたことがある人(4)薬やたばこのひびきなどがある人(5)乳幼児
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位
皮膚

副作用
発疹・発赤、かゆみ、はれ



A3110

こんな症状にお使いください

- ★生理時のかゆみ
- ★下着かぶれ
- ★おりものによるかゆみ
- ★陰部周辺部のかゆみ
- ★汗ムシによるかゆみ
- ★その他の炎症・かゆみ・かぶれなど

かゆみ・かぶれの治療薬

1日数回
適量を患部に塗布

白色クリーム



デリケートゾーンの かゆみ・かぶれに

ラカナウSクリーム

かゆみ止め治療薬 | 非ステロイド剤 | 第2類医薬品

紙

4 962307 091258

使用期限

製造番号