

開封口

省資源化のため箱が説明書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の説明をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

▲ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
 - (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
2. 次の部位には使用しないでください。

目、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

第2類医薬品



販売名: テシトンHPローション

【成分・分量】100g中
 ヘパリン類似物質……………0.3g
 添加物: dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、パラベン、エデト酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンペヘニルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ジイソプロパノールアミン、ヒアルロン酸ナトリウム、香料、pH調節剤

【効能・効果】

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあとの皮膚のしこり・つぶばり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ、筋肉痛、関節痛

発売元 協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【消費番相談窓口】
 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
 ☎058-246-8771
 受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00
 (土、日、祝日を除く)

副作用検査義務制度 ☎0120(149)931

MADE IN JAPAN

乾燥肌

角化症などに

血行促進・皮膚保湿剤

テシトンHP **ローション**

第2類医薬品

50g

かさつく肌の治療薬

乾燥肌

角化症などに

血行促進・皮膚保湿剤

テシトンHP

ローション

ヘパリン類似物質
0.3%配合

高保湿
タイプ

ステロイド配合
無着色

☑ 低刺激性

尿素は
配合していません

50g

第2類医薬品



【用法・用量】

1日1~数回、適量を患部に擦り込むか、またはガーゼ等にのばして貼ってください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります。)

※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2) 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。



4 962307 096031

上段: 使用期限、下段: 製造番号



A2108