

乾燥肌の保湿に

乾燥肌治療・保湿クリーム

保湿

血行促進

抗炎症

用法・用量

1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、またはガーゼ等へのぼして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
 - ※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる可能性があります)
 - ※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因となったり品質が変わります)。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

乾燥肌の保湿に

乾燥肌治療・保湿クリーム

ヘパロイドクリーム

ヘパリン類似物質 0.3% 配合



油性クリーム

保湿

血行促進

抗炎症

60g

第2類医薬品

第2類医薬品

販売名:ヘパロイドクリーム

成分・分量 100g中

ヘパリン類似物質………0.3g
添加物:グリセリン、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、白色ワセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セレスチン、パラベン、エドト酸ナトリウム水和物、ヒアルロン酸ナトリウム

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛

発売元

協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【消費者相談窓口】

協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎058-246-8771
受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

MADE IN JAPAN



A2106

開封口

省資源化のため、箱が説明書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の説明をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
 - (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
2. 次の部位には使用しないでください。
目、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



0 000210 503483



4 962307 096048

使用期限

製造番号