

【効能・効果】 ●滋養強壮 ●虚弱体質  
●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養  
障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期  
などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回  
1本(100mL)を服用してください。

●用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量(100mL)中  
チアミン硝酸物(ビタミンB1)10mg・リ  
ボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタ  
ミンB2)5mg・ピリドキシン塩酸塩(ビタミ  
ンB6)5mg・ニコチン酸アミド40mg・  
無水カフェイン50mg・タウリン2000  
mg・L-リシン塩酸塩100mg・ローヤ  
ルゼリーチンキ50mg(原生薬換算量  
50mg)・ジャシヨウシエキス20mg(原  
生薬換算量200mg)

添加物として、クエン酸・DL-リンゴ酸・  
白糖・ブドウ糖・D-ソルビトール・ハチミ  
ツ・安息香酸Na・パラベン・香料を含有  
します。(アルコール0.2mL以下)

●本剤の服用により、尿が黄色くなる  
ことがあります。これは本剤中のリボフ  
ラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン  
B2)によるもので心配ありません。

副作用救済制度

電話 0120-149-931

100mL

協和薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

お客様相談室 ☎ 058-246-8771

# 2000

滋養強壮 / 肉体疲労時の栄養補給

タウリン2000<sub>mg</sub>

ジャシヨウシエキス配合

## スラトミン2000

第3類医薬品

【販売名】スラトミン2000

【使用上の注意】 **相談すること**

(1)服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可  
能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持っ  
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感、下痢

(2)次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医  
師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●しばらく服用しても症状が  
よくなる場合

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない

涼しい所に保管してくださ

い。(2)小児の手の届かない

所に保管してください。

(3)使用期限を過ぎた製品

は服用しないでください。

(4)本剤は生薬を配合して

いますので、まれに沈殿又


は浮遊を生じることがあり

ますが、薬効には変わりあ

りませんので、よく振ってか

ら服用してください。

金 属：キャップ  
ガラス：ビン



使用期限

製造番号