

# 製品説明書

## 【お薬の内容】



＜Kyowa-Gifu-Japan＞

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品 **アレルギー用薬** (ソフトカプセル剤)

## ノスポールALソフトカプセル

”ノスポールALソフトカプセル”は、じんましん、湿疹、かぶれによる皮膚のはれやかゆみ、花粉やハウスダストなどによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりの鼻アレルギー症状に、効果を発揮します。また、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。

## 【成分・分量 (2カプセル中/成人一日量)】

## はたらき

アゼラスチン塩酸塩 2mg  
....

アレルギー症状の原因となるヒスタミンやロイコトリエンなどの作用を抑えて、鼻や皮膚のアレルギー症状を緩和します。

## 【効能・効果】

○花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり  
○じんましん、湿疹・かぶれによる症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ



## 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 15歳未満の小児
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬)

3. 服用前後は飲酒しないでください
4. 服用後, 乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがある。)
5. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
6. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 高齢者。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。  
排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人。  
緑内障
- (6) アトピー性皮膚炎、またはアトピー素因があると診断を受けた人。
- (7) 気管支ぜんそくの診断を受けた人
- (8) 発熱やせき、黄色で粘りのある鼻みずなどのかぜ症状がある人。
- (9) 鼻炎の場合でアレルギー性鼻炎か、かぜによる鼻炎かわからない人。

または、皮膚の症状が「じんましん、湿疹、かぶれ」によるものか、虫さされや化膿等他の原因によるものかわからない人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内及び口周囲のあれ、食欲不振、胸やけ、胃部不快感、腹痛
精神神経系	倦怠感、めまい、頭痛、手足のしびれ
循環器	顔面のほてり、動悸
呼吸器	息苦しさ、鼻乾燥
泌尿器	頻尿、排尿困難、血尿
肝臓	全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなる
その他	浮腫、月経異常

3. 鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮膚の症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善がみられない場合は服用を中止し、日本語の添付文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 服用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 口のかわき、便秘、下痢、眠気
5. 鼻炎の症状の場合で2週間以上服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して服用してください。
6. じんましん、湿疹、かぶれなどの皮膚の症状の場合で、症状の軽減がみられるが繰り返し症状がおこるなど1週間以上症状が継続する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【用法・用量】

次の量を朝食後及び就寝前に水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回
15歳未満	服用しないこと	

#### <用法・用量に関する注意>

- (1) 花粉など季節性アレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
- (2) かみくだかないように早めにのみこんでください。  
(苦みを感じる場合があります。)
- (3) カプセルの取り出し方。

右図のように、カプセルの入っているシートの凸部を指先で強く押して、裏面の膜を破り、カプセルを取り出して服用してください。



(誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、本剤の使用期限は外箱に記載してあります。

#### 【添加物】

プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシル35ヒマシ油、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、緑色3号を含有する。

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://WWW.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_cmp/index.html](http://WWW.pmda.go.jp/kenkouhigai_cmp/index.html)

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

## 質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771



受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (週末、祝日を除く)

**[限定対応のお願い]**

**<Kyowa-Gifu-Japan>**

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト ([www.kyowa-ci.co.jp](http://www.kyowa-ci.co.jp)) に掲載されています。

## 免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は日本語添付文書に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性もあります。